

BILJNA VRSTA: KROMPIR, PARADAJZ, KRSTAVAC, LUK, TIKVICA

ŠTETNI ORGANIZMI: **PLAMENJAČA KROMPIRA, PLAMENJAČA PARADAJZA, PLAMENJAČA KRSTAVACA, PLAMENJAČA LUKA**

U PROTEKLE TRI NEDELJE PROIZVODNJU POVRĆA KARAKTERIŠU ČESTE, GOTOVO SVAKODNEVNE PADAVINE, KOJE UZ VISOKU RELATIVNU VLAŽNOST VAZDUHA I REALIZOVANE TEMPERATURE IZUZETNO POGODUJU RAZVOJU PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE U USEVIMA POVRĆA.

PREGLEDIMA USEVA KROMPIRA, PARADAJZA, KRSTAVACA, LUKA I TIKVICA UOČENO JE PRISUSTVO SIMPTOMA PLAMENJAČA.

ZA NAREDNI PERIOD SE NAJAVLJUJE NASTAVAK TRENDA PADAVINA KOJE ĆE STVORITI NOVE POVOLJNE USLOVE ZA RAZVOJ OVIH PATOGENA, TE MOŽE DOĆI DO VISOKOG INTENZITETA ZARAZE. ZA KRATKO VREME, U OVAKVIM USLOVIMA, MOŽE DOĆI DO VEOMA VELIKIH ŠTETA I PROPADANJA ČITAVIH USEVA.

PREPORUKA

U OVOM MOMENTU, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA KOJI IMAJU KURATIVNO I ANTISPORULATIVNO DELOVANJE, KAKO BI SE SPREČILO NAGLO ŠIRENJE SIMPTOMA PLAMENJAČA U POLJU I PROPADANJE USEVA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	BILJNA VRSTA
INFINITO SC	PROPAMOKARB-HIDROHLORID+FLUOPIKOLID	1,2-1,6 L/HA	KROMPIR, PARADAJZ, LUK, TIKVICE
AXIDOR	PROPAMOKARB-HIDROHLORID+CIMOKSANIL	2,5 L/HA	KROMPIR, PARADAJZ
EQUATION PRO WG	CIMOKSANIL+FAMOKSADON	0,4 KG/HA	KROMPIR, PARADAJZ
ORVEGO	DIMETOMORF+AMETOKTRADIN	0,8 L/HA	KROMPIR, PARADAJZ, KRSTAVAC, TIKVICE
ACROBAT MZ WG, SPHINX MZ	DIMETOMORF+MANKOZEB	2-2,5 KG/HA	KROMPIR, KRSTAVAC

U USLOVIMA KAKVI TRENUTNO VLADAJU U PROIZVODNJI NEOPHODNO JE SKRATITI INTERVAL IZMEĐU DVA TRETMANA (DO 7 DANA).

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. SIMPTOM PLAMENJAČE KROMPIRA



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE KROMPIRA



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE PARADAJZA



SLIKA 4. SIMPTOM PLAMENJAČE NA PLODOVIMA PARADAJZA



SLIKA 5. SIMPTOM PLAMENJAČE KRSTAVACA



SLIKA 4. SIMPTOM PLAMENJAČE LUKA