

BILJNA VRSTA: KRUŠKA

ŠTETNI ORGANIZMI: **OBIČNA KRUŠKINA BUVA, KRUŠKINA ERIOFIDNA GRINJA, BRAON MRAMORASTA STENICA, BILJNE VAŠI, ČAĐAVA KRSTAVOST KRUŠKE, SIVA PEGAVOST LISTA KRUŠKE**

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE NALAZE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. U KRUŠICIMA SE REGISTRUJE PRISUSTVO VEĆEG BROJA ŠTETOČINA.

NAJDOMINANTNIJE JE PRISUSTVO **OBIČNE KRUŠKINE BUVE** KOJA JE I NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. LARVE KOJE SE HRANE SOKOVIMA BILJKE PRODUKUJU VELIKU KOLIČINU MEDNE ROSE NA KOJOJ SE RAZVIJA GLJIVA ČAĐAVICA. NAPADNATU BILJNI DELOVI POSTAJU CRNI, SMANJUJE SE POVRŠINA LISTA KOJA MOŽE DA VRŠI FOTOSINTEZU, A CRNI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

NA PODRUČJU VOJVODINE JE U TOKU POLAGANJE JAJA PRVE LETNJE GENERACIJE. PORED SVIH STUPNJEVA LARVI NA NALIČJU LISTOVA I U PAZUHU CVETNIH I LISNIH DRŠKI, U ZASADIMA SE MOGU UOČITI I ODRASLE JEDINKE KOJE POLAŽU JAJA, A PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE JE REGISTROVANO U GOTOVO SVIM PROIZVODNIM ZASADIMA.

U VELIKOM BROJU ZASADA JE UOČENO I PRISUSTVO **BILJNIH VAŠI** ČIJE KOLONIJE SE NALAZE NA NALIČJU LIŠĆA. U POJEDINIM ZASADIMA JE UOČENO PRISUSTVO **KRUŠKINE ERIOFIDNE GRINJE I BRAON MRAMORASTE STENICE**. SIMPTOMI NAPADA ERIOFIDNE GRINJE SE MOGU PREPOZNATI PO NAJPRE ZELENIH, A KASNIJEM CRVENIH PLIKOVIMA KOJI SE NALAZE NA LISTOVIMA I TEK ZAMETNUTIM PLODOVIMA. PRISUSTVO BRAON MRAMORASTE STENICE U OVIM, POČETNIM, FAZAMA RAZVOJA PLODOVA MOŽE BITI VEOMA DESTRUKTIVNO I DOVESTI DO VELIKIH DEFORMITETA PLODOVA USLED NJIHOVE ISHRANE.

PREPORUKA: ZA SUZBIJANJE SVIH NAVEDENIH ŠTETOČINA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE INSEKTICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | KONCENTRACIJA |
|--|------------------|---------------|
| VERTIMEC 018 EC, ABASTATE, VERTIGO 1,8 EC, AMON 020 EW, INVERT EW, KRAFT 1,8 EW, WEBELEX | ABAMAECTIN | 0,15% |
| + | + | |
| DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX | DELTAMETRIN | 0,05% |

U SLUČAJU NAJAVE PADAVINA, SA CILJEM SPREČAVANJA ZARAZA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRSTAVOSTI KRUŠKE I SIVE PEGAVOSTI LISTA KRUŠKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA NA BAZI MANKOZEBA ILI FOLPETA.



SLIKA 1. RAZLIČITI STADIJUMI OBIČNE KRUŠKINE BUVE I MEDNA ROSA NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 2. ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 3. BILJNE VAŠI NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 4. SIMPTOMI NAPADA KRUŠKINE ERIOFIDNE GRINJE



SLIKA 5. BRAON MRAMORASTA STENICA NA KRUŠCI