

BILJNA VRSTA: **ULJANA REPICA**

ŠTETNI ORGANIZMI: **REPIČINA LISNA OSA, LISNE VAŠI, BUVAČI, GLODARI**

USLED ODSUSTVA PADAVINA U PRETHODNOM PERIODU, SETVA ULJANE REPICE U RANIJIM ROKOVIMA JE OBAVLJENA NA MALOM BROJU POVRŠINA I TAKVI USEVI SU U FAZI 4-5 RAZVIJENIH LISTOVA. NA VEĆINI PARCELA SETVA JE OTPOČELA PRED PADAVINE REALIZOVANE 23-25.09. I OVI USEVI SE VEĆINOM NALAZE U FAZI KLIJANJA I NICANJA, PA DO FAZE KOTILEDONA ILI DVA RAZVIJENA LISTA.

NA PONIKLIM USEVIMA ULJANE REPICE REGISTRUJE SE PRISUSTVO ŠTETOČINA KOJE, U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA USEVA, MOGU DA UGROZE PROIZVODNJU OVE INDUSTRIJSKE KULTURE: REPIČINE LISNE OSE, LISNIH VAŠI, BUVAČA, GLODARA.

PAGUSENICE **REPIČINE LISNE OSE** U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA BILJAKA ISHRANOM MOGU PRIČINITI VEOMA ZNAČAJNE ŠTETE, A USLED JAČEG NAPADA MOŽE DOĆI I DO GOLOBRSTA. NA POJEDINIM PARCELAMA REGISTRUJE SE I PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI **BUVAČA** KOJE RUPICAŠTO IZGRIZAJU KOTILEDONE I MLADO LIŠĆE, KAO I PRISUSTVO **VAŠI** KOJE IMAJU VEOMA ZNAČAJNU ULOGU U PRENOŠENJU FITOPATOGENIH VIRUSA.

ZNAČAJ SVIH NAVEDENIH ŠTETOČINA SE POVEĆAVA U USLOVIMA SUVOG I TOPLOG VREMENA KAKVO TRENUTNO VLADA U PROIZVODNJI, A U NAJAVI JE I ZA NAREDNI PERIOD.

HEMIJSKE MERE SUZBIJANJA NAVEDENIH ŠTETNIH INSEKATA TREBA IZVODITI PO POSTIZANJU PRAGOVA ŠTETNOSTI:

- REPIČINA LISNA OSA – JEDNA MLADA PAGUSENICA PO BILJCI ILI 0,5 STARIJH PAGUSENICA PO BILJCI
- LISNE VAŠI – 20 % INFESTIRANIH BILJAKA LISNIM VAŠIMA U FAZI ULJANE REPICE OD KOTILEDONA DO 6. RAZVIJENOG LISTA
- BUVAČI – 5-10 % UNIŠTENE LISNE POVRŠINE.

PROIZVOĐAČIMA ULJANE REPICE SE PREPORUČUJU REDOVNI OBILASCI USEVA ULJANE REPICE I PO POTVRDI PRISUSTVA ŠTETNIH INSEKATA I POSTIZANJU NAVEDENIH PRAGOVA ŠTETNOSTI, PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX	DELTAMETRIN	0,2-0,3 L/HA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,25 L/HA

U PONIKLIM USEVIMA ULJANE REPICE, KAO I U TEK POSEJANIM, REGISTRUJU SE I RUPE OD **POLJSKIH GLODARA** (POLJSKI MIŠ I POLJSKA VOLUHARICA) KOJE MOGU PRIČINITI VEOMA ZNAČAJNE ŠTETE, A DETALJNIJE INFORMACIJE O OVIM ŠTETOČINAMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. USEV ULJANE REPICE IZ RANOG ROKA SETVE



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA REPIČINE LISNE OSE



SLIKA 3. JAJA REPIČINE LISNE OSE NA LISTOVIMA ULJANE REPICE



SLIKA 4. PAGUSENICE REPIČINE LISNE OSE



SLIKA 5. PAGUSENICE REPIČINE LISNE OSE



SLIKA 6. VAŠI NA NALIČJU LISTOVA ULJANE REPICE



SLIKA 7. ŠTETE OD BUVAČA NA ULJANOJ REPICI



SLIKA 8. RUPE OD GLODARA U USEVU ULJANE REPICE I NA SAMONIKLOJ ULJANOJ REPICI