

BILJNE VRSTE: VOĆE, POVRĆE (**ZAŠTITA NAKON GRADA**)

ŠTETNI ORGANIZMI: **TRULEŽI, PEGAVOSTI, PLAMENJAČE I DR.**

U TOKU JUČERAŠNJEG DANA POJEDINA PROIZVODNA PODRUČJA U VOJVODINI (OPŠTINE VRBAS, KULA, SRBOBRAN, APATIN, ODŽACI, SEČANJ) SU POGOĐENA VREMENSKIM NEPOGODAMA PRAĆENIM OLUJNIM VETROM I GRADONOSNIM PADAVINAMA I REGISTROVANE SU ZNAČAJNE ŠTETE NA USEVIMA I ZASADIMA.

JAKE OLUJE SA GRADOM NANOSE ŠTETE USEVIMA UZROKUJUĆI POVREDE RAZLIČITIH DELOVA BILJAKA, OPADANJE CVETOVA I PLODOVA, KAO I LOMLJENJE ZELJASTIH I DRVENASTIH DELOVA BILJAKA. DODATNO, MESTA POVREDE OTVARAJU PUT ZA OSTVARENJE INFEKCIJA PATOGENIM GLJIVAMA I BAKTERIJAMA. USLED JAKIH VETROVA KOJI SE JAVLJAJU TOKOM OLUJA VRLO ČESTO DOLAZI I DO PLEGANJA POLJOPRIVREDNIH USEVA. SVE OVO DOVODI DO ZNAČAJNIH GUBITAKA PRINOSA KAKO U SMISLU KVALITETA, TAKO I KVANTITETA.

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA I ZASADA I UKOLIKO SE REGISTRUJU POVREDE IZAZVANE POMENUTIM NEPOGODAMA, PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE **U ŠTO KRAĆEM VREMENSKOM ROKU.**

U ZASADIMA **JABUČASTOG VOĆA** SADA POSTOJI IZUZETNO VISOK RIZIK OD ZARAZA PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE TE SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD PREPARATA NA BAZI BAKRA ILI FOSETIL ALUMINIJUMA. TAKOĐE, SA CILJEM ZACELJIVANJA NASTALIH RANA I SPREČAVANJA PRODORA RAZLIČITIH PATOGENA PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA NA BAZI KAPTANA.

U ZASADIMA **KOŠTIČAVOG VOĆA** GDE JE U TOKU SAZREVANJE PLODOVA (KASNI SORTIMENT BRESAKA I NEKTARINA, ŠLJIVE) POSTOJI RIZIK OD ZARAZE RAZLIČITIM PATOGENIMA KOJE PROUZROKUJU TRULEŽ PLODOVA TE JE PREPORUKA PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH PREPARATA UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
SIGNUM	BOSKALID + PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA	BRESKVA – 7 DANA ŠLJIVA – 3 DANA
AKORD, LIRA	TEBUKONAZOL	0,75 L/HA	BRESKVA – 7 DANA
FLUX	FLUDIOKSONIL	1 L/HA	BRESKVA – 7 DANA ŠLJIVA – 3 DANA

U ZASADIMA **VINOVE LOZE** SE U CILJU ZACELJIVANJA RANA NASTALIH MEHANIČKIM OŠTEĆENJEM, PREPORUČUJE PRIMENA REGISTROVANIH PREPARATA NA BAZI BAKRA. TAKOĐE, POSTOJI RIZIK OD ZARAZE GROZDA OD PROUZROKOVAČA SIVE TRULEŽI TE JE PREPORUKA NEKI OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CANTUS, BOSCO, CORVET WG, DEKADA	BOSKALID	1-1,2 L/HA
LIBRETO, TELDOR 500 SC	FENHEKSAMID	1 L/HA
PEHAR, BOTUS SC 400	PIRIMETANIL	2 L/HA

U USEVIMA **POVRĆA** SE SA CILJEM SPREČAVANJA PRODORA PATOGENA PROZROKOVAČA BOLESTI KROZ NASTALE RANE, PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD PREPARATA NA BAZI BAKRA ILI MANKOZEBA.

S OBZIROM DA JE BERBA POJEDINIH VRSTA VOĆA I POVRĆA U TOKU PRILIKOM SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA!

UZ NAVEDENE PREPARATE JE PREPORUKA DA SE PRIMENE I PREPARATI NA BAZI AMINOKISELINA KOJI PODSTIČU BILJKE DA SE IZBORE SA STRESNIM USLOVIMA KOJI SU NASTALI ZBOG POVREDA TKIVA NAKON GRADA.



SLIKA 1. USEV SUNCOKRETA POGOĐEN JUČERAŠNJIM NEPOGODAMA



SLIKA 2. USEV SOJE POGOĐEN JUČERAŠNJIM NEPOGODAMA




SLIKA 3. USEV KUKURUZA POGOĐEN JUČERAŠNJIM NEPOGODAMA



SLIKA 4. USEV PAPIRIKE POGOĐEN JUČERAŠNJIM NEPOGODAMA



SLIKA 5. ZASAD KRUŠAKA POGOĐEN JUČERAŠNJIM NEPOGODAMA



SLIKA 6. ZASAD MALINA POGOĐEN JUČERAŠNJIM NEPOGODAMA