

BILJNE VRSTE: VOĆE, POVRĆE (**ZAŠTITA NAKON GRADA**)

ŠTETNI ORGANIZMI: **TRULEŽI, PEGAVOSTI, PLAMENJAČE I DR.**

TOKOM JUČERAŠNJE VEČERI SU NA POJEDINIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI VOJVODINE REGISTROVANE GRADONOSNE PADAVINE PRAĆENE JAKIM VETROM I VELIKOM KOLIČINOM PADAVINA. GRAD JE REGISTROVAN NA TERITORIJI OPŠTINA SREMSKA MITROVICA, ŠID I NOVI SAD. GRADOM SU NAJVIŠE POGOĐENI LOKALITETI ČALMA, MANĐELOS, DIVOŠ, LAĆARAK, MOROVIĆ, VIŠNJIĆEVO, BOSUT, ČEREVIĆ, BEGEČ I FUTOG.

PORED GRADA, ZA SAMO NEKOLIKO SATI, NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU SMEŠTENE U USEVE I ZASADE, ZABELEŽENE SU IZUZETNO VELIKE KOLIČINE PADAVINA.

NA LOKALITETU MANĐELOS JE ZA SAMO JEDAN SAT PALO 25 LITARA KIŠE PO METRU KVADRATNOM, NA LOKALITETU ČEREVIĆ 31 LITRA A NA LOKALITETU JAZAK 37 LITARA.

PADAVINE SA GRADOM PROUZROKUJU MEHANIČKE POVREDE NA BILJKAMA I OTVARAJU PUT ZA OSTVARENJE INFEKCIJA FITOPATOGENIM GLJIVAMA I BAKTERIJAMA.

PREPORUKA:

U ZASADIMA JABUČASTOG VOĆA, NA LOKALITETIMA GDE JE BILO GRADA, SADA POSTOJI IZUZETNO VISOK RIZIK OD ZARAZA PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE TE SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD NAVEDENIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FUNGURAN OH	BAKAR-HIDROKSID	0,05%
ALIETTE FLASH, FORTUNA, LEGAT SP	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,45%
FOSCO	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,3%

U ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA POSTOJI RIZIK OD ZARAZA PROUZROKOVAČEM RAK RANA I BAKTERIOZNOG IZUMIRANJA TE SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH PREPARATA KAKO BI SE ZATVORILE RANE I SPREČIO PRODOR BAKTERIJE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MERPAN 50 WP, CAPTAN 50 WP, VENTURION, METOD 480 SC, CAPI, MERPAN 48 SC	KAPTAN	0,3%

U ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA KOJE JE U RAZLIČITIM FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA POSTOJI RIZIK OD ZARAZA RAZLIČITIM PATOGENIMA KOJE PROUZROKUJU TRULEŽ PLODOVA TE JE PREPORUKA PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH PREPARATA UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
SIGNUM, LUMINIS	BOSKALID + PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA	BRESKVA, KAJSIJA – 7 DANA TREŠNJA - 14 DANA

LUNA SENSATION	TRIFLOKSISTROBIN+FLUOPIRAM	0,167 L/HA	TREŠNJA – 3 DANA
----------------	----------------------------	------------	------------------

U ZASADIMA JAGODA POSTOJI RIZIK OD ZARAZA PROUZROKOVAČEM SIVE TRULEŽI PLODOVA, TE SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE S OBZIROM DA JE BERBA U TOKU:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA / KONCENTRACIJA	KARENCA
TELDOR	FENHEKSAMID	1,5 L/HA	1 DAN
CIDELY TOP	DIFENOKONAZOL + CIFLUFENAMID	100 ML/ 100 L VODE	3 DANA
LUNA SENSATION	TRIFLOKSISTROBIN+FLUOPIRAM	0,8 L/HA	7 DANA
SWICH 62,5 WG	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	0,8-1 KG/HA	7 DANA

U USEVIMA POVRĆA SE SA CILJEM SPREČAVANJA PRODORA PROZROKOVAČA BOLESTI KROZ RANE IZAZVANE GRADOM, PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD PREPARATA NA BAZI BAKRA ILI MANKOZEBA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
FUNGURAN OH, KOCIDE 2000, EVEREST, FUNGOCEM SC, CHAMP DP	BAKAR	PO REGISTRACIJI
MANKOGAL 80, MANKOGAL EKSTRA, DITHANE M 45	MANKOZEB	2-2,5 KG/HA

PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI U ŠTO KRAĆEM VREMENSKOM ROKU, ČIM SE OMOGUĆI ULAZAK MEHANIZACIJE NA PARCELE, NAJBOLJE U ROKU OD 24 H.

UZ NAVEDENE PREPARATE JE PREPORUKA DA SE PRIMENE I PREPARATI NA BAZI AMINOKISELINA KOJI PODSTIČU BILJKE DA SE IZBORE SA STRESNIM USLOVIMA KOJI SU NASTALI ZBOG POVREDA TKIVA NAKON GRADA.



SLIKA 1. NEPOSREDNO NAKON GRADA, USEV PŠENICE, SREM, 17.5.2023.



SLIKA 2. NEPOSREDNO NAKON GRADA, USEV PŠENICE, SREM, 17.5.2023.



SLIKA 3. ŠTETE OD GRADA



SLIKA 4. ŠTETE OD GRADA



SLIKA 5. ŠTETE OD GRADA NA TREŠNJAMA



SLIKA 6. ŠTETE OD GRADA NA ŠLJIVAMA



SLIKA 7. ŠTETE OD GRADA NA USEVU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 8. ŠTETE OD GRADA NA USEVU KUKURUZA