

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI BRESAKA I NEKTARINA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE PROIZVODNI ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, OD ZAVRŠNIH FAZA RAZVOJA PLODA DO RAZLIČITIH FAZA SAZREVANJA PLODA. BERBA RANOG SORTIMENTA JE ZAPOČELA.

PREGLEDOM ZASADA JE UOČENO PRISUSTVO ODRASLIH JEDNIKI I LARVI TRIPSA. OVE ŠTETOČINE PRAVE DIREKTNE ŠTETE SVOJOM ISHRANOM, SISAJUĆI SOKOVE SA SVIH NADZEMNIH DELOVA BILJAKA. NA NAPADNUTIM PLODOVIMA DOLAZI DO POJAVE OŠTEĆENJA U VIDU RAZLIČITIH NEKROZA I DEFORMITETA.

TAKOĐE, PREGLEDOM ZASADA BRESKA I NEKTARINA UOČENO JE I PRISUSTVO POLOŽENIH JAJA BRESKVINOG SMOTAVCA. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE. NA MESTU GDE SE LARVA UBUŠILA U PLOD MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ NJEGA I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I OTPADAJU PRE VREMENA.

NA PODRUČJU AP VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE TE ŠTETOČINE.

PREPORUKA

SA CILJEM ZAŠTITE BRESAKA I NEKTARINA OD NAVEDENIH ŠTETOČINA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,075-0,1%	7 DANA

U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVI SU OSETLJIVI NA INFEKCIJU OD STRANE RAZLIČITIH VRSTA PROUZROKOVAČA TRULEŽI. U NAREDNIM DANIMA SE NAJAVLJUJE NESTABILNO VREME SA MOGUĆIM PADAVINAMA KOJE MOŽE STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJU OD STRANE NAVEDENIH PATOGENA. U CILJU ZAŠTITE PLODOVA PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
AKORD, LIRA, OLIGOSAN 25 EC	TEBUKONAZOL	0,5 L/HA	7 DANA
IMAGE	PIRAKLOSTROBIN	0,4-0,6 L/HA	7 DANA

JOŠ JEDNOM NAPOMINJEMO DA PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA. U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA U KOJIMA JE BERBA U TOKU ILI SE ONA UČEKUJE U NAREDNIM DANIMA NIKAKO NE TREBA SPROVODITI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.

SVI NAVEDENI ŠTETNI ORGANIZMI, POJEDINI TRIPSI, BRESKVIN SMOTAVAC I POJEDINE VRSTE TRULEŽI IZ RODA MONILINIA SU U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE KARANTINSKE VRSTE, TAKO DA SVI KOJI SU ORIJENTISANI KA IZVOZU TREBA DA OBRATE POSEBNU PAŽNJU NA NJIHOVO SUZBIJANJE.



SLIKA 1: FAZA RAZVOJA BRESAKA



SLIKA 2. TRIPS NA PLODU



SLIKA 3. ODRASLA JEDINKA TRIPSA



SLIKA 4. LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA U MLADARU



SLIKA 5. UBUŠENJE NA PLODU NEKTARINE OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA



SLIKA 6. SIMPTOM TRULEŽI NA PLODU

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM