POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O KUKURUZNOM PLAMENCU
.....

KUKURUZNI PLAMENAC JE NA PODRUČJU VOJVODINE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. TO JE ŠTETOČINA VELIKOG BROJA BILJNIH VRSTA, A U NAŠIM USLOVIMA NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U PROIZVODNJI KUKURUZA I PAPRIKE.

PRE 15 DANA INFORMISALI SMO VAS O AKTIVNOSTI DRUGE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA, PRISUSTVU JAJNIH LEGALA I POTREBI SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE. OD TADA I DALJE SE BELEŽI AKTIVNOST DRUGE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA PAPRIKE, SEMENSKOG KUKURUZA I KUKURUZA ŠEĆRECA REGISITROVANO JE PRISUSTVO NOVOPOLOŽENIH JAJNIH LEGALA KUKURUZNOG PLAMENCA, A PROCENAT BIJAKA SA NOVOPOLOŽENI JAJNIM LEGLIMA KREĆE SE DO 10. NA SVETLOSNIM LOVNIM LAMPAMA SE BELEŽE ULOVI ODRASLIH JEDINKI OVE ŠTETOČINE.

SLIKA 1. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA LISTU PAPRIKE

SLIKA 2. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA LISTU KUKURUZA

SLIKA 3. ODRASLE JEDINKE KUKURUZNOG PLAMENCA – ULOV NA SVETLOSNOJ LOVNOJ LAMPI

U U SEVIMA PAPRIKE NAJVEĆE ŠTETE PRAVE LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE. NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I PODLOŽNI SU NAPADIMA RAZLIČITIH VRSTA TRULEŽI. NA KUKURUZU LARVE SE UBUŠUJU I HRANE SE UNUTAR STABLA I NA KLIPOVIMA. NA MESTIMA ISHRANE DOLAZI DO INFEKCIJE RAZNIM VRSTAMA GLJIVA KOJE U POSEBNIM USLOVIMA IMAJU SPOSOBNOST SINTEZE MIKOTOKSINA OPASNIH PO ZRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA.

SLIKA 4. LARVA KUKURZNOG PLAMENCA U PLODU PAPRIKE

SLIKA 5. LARVA KUKURZNOG PLAMENCA NA STABLU KUKURUZA

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA PAPRIKE, KUKURUZA ŠEĆERCA I SEMENSKOG KUKURUZA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO JAJNIH LEGALA KUKURUZNOG PLAMENCA. UKOLIKO SE UOČI NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CORAGEN 20-SC	HLORANTRANILIPROL	0,1-0,15 L/HA
AMPLIGO 150 ZS	HLORANTRANILIPROL+LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,25 L/HA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,25 L/HA
AFFIRM 095 SG	EMAMEKTIN BENZOAT	1,5 – 2 KG/HA

PRILIKOM SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI I MAKSIMALNOM BROJU DOZVOLJENIH TRETMANA INSEKTICIDA U TOKU JEDNE VEGETACIJE.

TOKOM VIZUELNIH PREGLEDA REGISTROVANA JE AKTIVNOST PARAZITNIH OSICA IZ RODA *Trichogramma*. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO PARAZITIRANIH, TO JEST CRNIH JAJNIH LEGALA, PRILIKOM IZBORA INSEKTICIDA PREDNOST TREBA DATI PREPARATIMA KOJI NEĆE ŠTETNO DELOVATI NA KORISNE ORGANIZME POPUT PREPARATA CORAGEN.

SLIKA 5. PARAZITIRANA OSICA IZ RODA *Trichogramma* NA JANOM LEGLU KUKURUZNOG PLAMENCA

SLIKA 6. PARAZITIRANO, CRNO JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA OD STRANE OSICE *Trichogramma.*

TAKOĐE, VIZUELNIM PREGLEDIMA REGISTROVANO JE I PRISUSTVO NOVOPOLOŽENIH JAJA PAMUKOVE SOVICE. U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I USEVA NOVOPOLOŽENA JAJA UOČENA SU NA DO 20% BILJAKA. NAVEDENI INSEKTICIDI DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE OVE ŠTETOČINE.

SLIKA 7. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA PLODU PAPRIKE

SLIKA 8. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA LISTU PAPRIKE

U NAVEDENIM USEVIMA U KOJIMA JE BERBA U TOKU NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM