

BILJNE VRSTE: BRESKVA I NEKTARINA, MALINA, KUPINA, BOROVNICA, VINOVA LOZA

ŠTETNI ORGANIZAM: **AZIJSKA VOĆNA MUŠICA**

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA JE ŠTETOČINA JAGODIČASTOG VOĆA, KOŠTIČAVOG VOĆA I VINOVE LOZE. BILJNE VRSTE KOJE NAPADA OVA ŠTETOČINA NAJOSETLJIVJE SU U FAZAMA ZRENJA. ŽENKE POLAŽU JAJA U ZDRAVE PLODOVE. LARVE SE HRANE I RAZVIJAJU UNUTAR PLODOVA I DOLAZI DO NJIHOVOG POTPUNOG UNIŠTENJA. NA POKOŽICI PLODA, GDE ŽENKA POLAŽE JAJA, DOLAZI DO POVREDA I TAKVI PLODOVI SU PODLOŽNI INFEKCIJAMA RAZLIČITIM PROUZROKOVAČIMA TRULEŽI. ŠTETE KOJE PROUZROKUJE OVA ŠTETOČINA MOGU BITI I DO 100%.

TOKOM PROTEKLE DVE NEDELJE, NA LOVNIM KLOPKAMA ZA MONITORING AZIJSKE VOĆNE MUŠICE DOŠLO JE DO NAGLOG POVEĆANJA ULOVA ODRASLIH JEDINKI U ODNOSU NA PERIOD PRE TOGA. NA KLOPKAMA KOJE SU POSTAVLJENE U ZASADE BRESAKA, NEKTARINA, MALINA, KUPINA I VINOVE LOZE SE BELEŽI ULOV OD PREKO 100 ODRASLIH JEDINKI NA NEDELJNOM NIVOU.


TRENTNI VREMENSKI USLOVI SA PADOM TEMPERATURA VAZDUHA I POVIŠENIM VREDNOSTIMA RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA FAVORIZUJU BRZ RAZVOJ I RAZMNOŽAVANJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE, TE SE OČEKUJE POVEĆANJE NJENE BROJNOSTI A SAMIM TIM SE POVEĆAVA I RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA, KASNIH SORTI BRESAKA I NEKTARINA I VINOVOJ LOZI.

PREPORUKA

SA CILJEM SMANJENJA RIZIKA NASTANKA ŠTETA OD AZIJSKE VOĆNE MUŠICE U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA, KASNIH SORTI BRESAKA I NEKTARINA I VINOVOJ LOZI PREPORUČUJE SE PRIMENA SVIH RASPOLOŽIVIH MERA KONTROLE KOJE PODRAZUMEVAJU POSTAVLJANJE VELIKOG BROJA LOVNIH KLOPKI SA CILJEM NJENOG IZLOVLJAVANJA I SMANJENJA BROJNOSTI. MOGU SE KORISTITI KLOPKE NAPRAVLJENE OD PLASTIČNIH FLAŠA SA CRNIM VINOM, JABUKOVIM SIRČETOM U ODNOSU 1:1 I NEKOLIKO KAPI DETERDŽENTA. U CILJU MASOVNOG IZLOVLJAVANJA NEOPHODNO JE POSTAVITI VELIKI BROJ KLOPKI, NA IVIČNE DELOVE PARCELE NA RASTOJANJU OD 2 DO 3 METRA, A UNUTAR PARCELE NA RASTOJANJU OD 5 METARA.

TAKOĐE, PREPORUČUJE SE I UNIŠTAVANJE PREZRELIH PLODOVA, SKRAĆIVANJE INTERVALA BERBE, ODRŽAVANJE IVICA PARCELA U VIDU UKLANJANJA DIVLJIH VRSTA BILJAKA POPUT DŽANARIKE, DIVLJE KUPINE, ZOVE I DRUGIH KOJE MOGU BITI DOMAĆINI OVOJ ŠTETOČINI, KAO I KRČENJE NAPUŠTENIH VOĆNIH ZASADA.

S OBZIROM DA JE U TOKU BERBA MALINE, KUPINE I BOROVNICE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U OVIM ZASADIMA SE NE PREPORUČUJE. U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA SA KASNIM SORTIMENTOM I VINOGRADIMA, GDE SE BERBA NE OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU, AKTUELNA JE ZAŠTITA OD BRESKVINOG SMOTAVCA, CIKADE SCAPHIODEUS TITANUS I PEPELIJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA TE ĆE SE PRIMENOM INSEKTICIDA SA CILJEM ZAŠTITE OD OVIH ŠTETOČINA SMANJITI I POPULACIJA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE.




SLIKA 1. ODRASLE JEDINKE *D.suzukii* | ŠTETE NA PLODOVIMA



SLIKA 2. OŠTEĆENJA OD *D.suzukii* NA KUPINI




SLIKA 3. OŠTEĆENJA OD *D.suzukii* NA GROŽĐU



SLIKA 4. KLOPKA ZA *D.suzukii*



SLIKA 5. KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU



SLIKA 6. ŠEMA ZA POSTAVLJANJE KLOPKI